



Contraception et contragestion

Maîtriser la reproduction , c'est concilier le désir de se continuer au travers de la descendance et les contraintes d'un environnement naturel et social qui favorise ou contrarie ce désir





L'ancêtre du préservatif et du stérilet du temps des Egyptiens





Contraception mécanique

Préservatifs masculins et féminins









Contraception orale




1 Effet de molécules de synthèse contenues dans une pilule contraceptive sur la concentration sanguine en hormones ovariennes et hypophysaires chez une femme. Cette pilule contient du lévonorgestrel et de l'éthinylestradiol.



Le stérilet



La pilule du lendemain








La pilule du lendemain doit être prise moins de 72 heures après le rapport sexuel, elle contient un progestatif seul, à forte dose.

Deux comprimés doivent être pris à 12 heures d'intervalle, et l'action du progestatif à forte dose empêchera la nidation par délabrement de la muqueuse utérine, même si la fécondation a eu lieu.

La pilule du lendemain est disponible en vente libre en pharmacie, sous le nom de Norlévo, c'est une contraception d'urgence à utiliser de façon exceptionnelle.

La pilule abortive: RU 486



BILAN: Les moyens contraceptifs et contragestifs:

Le préservatif masculin et féminin constituent une barrière physique empêchant la rencontre des gamètes. Convenablement utilisés ce sont des moyens efficaces et constituent aussi une barrière contre les infections sexuellement transmissibles (IST) dont le VIH.

La contraception hormonale (pilule, implant, patch, anneau vaginal) repose sur le fait que le maintien d'un taux constant suffisamment élevé d'hormones ovariennes (oestrogène et progestérone de synthèse) a pour effet de supprimer le pic de LH et FSH et par conséquent l'ovulation.. Ces molécules de synthèse agissent comme des leurres sur le complexe hypothalamo-hypophysaire.

Le dispositif intra-utérin (DIU) ou stérilet est un élément placé dans la cavité utérine dont la présence réduit la progression des spermatozoïdes et empêche la nidation. Certains DIU diffuse de la progestérone ce qui empêche la muqueuse utérine des se développer normalement.

La pilule du lendemain à utiliser que exceptionnellement contient un progestatif à forte dose qui provoque le délabrement de la muqueuse utérine après un rapport non protégé.

Dans le cadre de l'IVG, interruption volontaire de grossesse des produits de synthèse par voie orale peuvent être utilisés. Le RU 486 est un analogue structural de la progestérone. En empêchant la progestérone d'agir, la muqueuse utérine se délabre d'où avortement.